



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
СексКонтроль спот-он

(организация-разработчик: Neoterica GmbH, Grillostr. 18, 45141, Essen, Germany / Неотерика ГмбХ, Грилло штр. 18, 45141, Эссен, Германия)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-12.15-3802 №ПВР-3-12.15/03231

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: СексКонтроль спот-он.

Международные непатентованные наименования действующих веществ: мегестрол, этинилэстрадиол.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

СексКонтроль спот-он содержит в качестве действующих веществ (ДВ): мегестрола ацетат – 2,5% и этинилэстрадиол – 0,02%, в качестве вспомогательных веществ: ментол, витамин Е и диэтиленгликоляmonoэтиловый эфир (ДЭМЭ).

3. По внешнему виду СексКонтроль спот-он представляет собой маслянистую бесцветную жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. После вскрытия флакона препарат хранят не более 6 месяцев в прохладном месте.

Препарат по истечении срока годности не должен применяться.

4. Выпускают СексКонтроль спот-он расфасованным по 3 мл в стеклянные или полимерные флаконы-капельницы с навинчивающимися крышками контроля первого вскрытия, упакованные поштучно в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5 °C до 30 °C.

6. СексКонтроль спот-он следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакологическая группа: гормоны и антагонисты.

10. Входящий в состав препарата синтетический гормон-прогестаген мегестрола ацетат действует на гипоталамо-гипофизарную систему, блокируя секрецию гонадотропных гормонов (фолликулостимулирующего и лютеинизирующего), препятствует развитию фолликулов, синтезу эстрогенов и появлению половой охоты. Применение препарата самкам до начала течки предотвращает овуляцию, а в начале фолликулярной фазы (первый-третий день течки) приводит к ее прекращению. У самцов мегестрола ацетат снижает уровень тестостерона в крови и, как следствие, угнетает половую активность и связанные с ней поведенческие реакции.

Эстроген этинилэстрадиол вступает во взаимодействие в клетках-мишениях со специальными эстрогеновыми рецепторами. У самок в комплексе с мегестролом ацетатом усиливает контрацептивный эффект, изменяя биологические свойства влагалищной среды, вязкость слизи шейки матки, что тормозит подвижность сперматозоидов, а изменения в эндометрии матки препятствуют имплантации оплодотворенной яйцеклетки. У самцов подавляет секрецию андрогенов и угнетает сперматогенез.

Входящие в состав препарата мегестрола ацетат и этинилэстрадиол, благодаря вспомогательным компонентам, легко проникают через кожу животного и попадают в системный кровоток, в результате чего гормоны мегестрола ацетат и этинилэстрадиол достигают и действуют на гипоталамо-гипофизарную систему и эстрогеновые рецепторы.

СексКонтроль спот-он по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к малоопасным веществам (4 класс опасности), в рекомендуемых дозах не оказывают местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

III. Порядок применения

11. СексКонтроль спот-он назначают кошкам для регуляции половой охоты:

- самкам (кошкам) для задержки и прерывания течки;
- самцам (котам) для снижения половой активности и коррекции поведения.

12. Противопоказано применение препарата при заболеваниях мочеполовой системы, опухолях, сахарном диабете, неполовозрелым, беременным и лактирующим животным.

13. При работе с препаратом СексКонтроль спот-он следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Не следует гладить животное и подпускать к маленьким детям во время курса применения препарата и в течении 72 часов после последней обработки.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует

избегать прямого контакта с препаратом СексКонтроль спот-он. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Не допускаются к работе с препаратом женщины в период беременности и грудного вскармливания.

14. Запрещается применение СексКонтроль спот-он неполовозрелым, беременным и лактирующим животным.

15. СексКонтроль спот-он наносят животным на кожу точечно в область затылка. Доза зависит от цели применения препарата, пола и массы животного:

| Показания | Начало применения | Доза | Курс применения |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Кошки | | | |
| Задержка течки | В период между течками | 2 капли на животное массой до 5 кг | 1 раз в неделю, но не более 18 мес. подряд |
| | | 4 капли на животное массой 5 - 10 кг | |
| Повторение курса возможно после проявления у кошки нормального полового цикла. | | | |
| Прерывание течки | Первые признаки течки, но не позже 2-х дней от начала | 4 капли на животное массой до 5 кг | 1 раз в сутки в течение 4-7 дней (до исчезновения признаков течки плюс 1 день) |
| | | 8 капель на животное массой 5 - 10 кг | |
| Коты | | | |
| Снижение полового возбуждения и коррекция поведения | При появлении первых признаков | 4 капли на животное массой до 5 кг | 1 раз в сутки в течение 7 дней |
| | | 8 капель на животное массой 5 - 10 кг | |
| | | Продолжить: | |
| | | 2 капли на животное массой до 5 кг | 1 раз в сутки в течение 14 дней |
| | | 4 капли на животное массой 5 - 10 кг | |

16. Побочных явлений и осложнений при применении СексКонтроль спот-он в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается.

При длительном применении или повторных курсах приема возможно изменение аппетита, поведенческих реакций и увеличение молочной железы.

17. Симптомов, возникающих при передозировке СексКонтроль спот-он, не установлено.

18. Информация об особенностях взаимодействия с другими лекарственными препаратами и кормовыми добавками отсутствует.

19. Особеностей действия лекарственного препарата при первом применении или при его отмене не выявлено.

20. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

21. СексКонтроль спот-он не предназначен для применения продуктивным животным.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата СексКонтроль спот-он, согласованная Россельхознадзором 31.07.2018 года.

| | | |
|---|---|---|
| Наименование производственной производителя препарата для применения. | и адрес площадки лекарственного ветеринарного | АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Россия, 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23. |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя. | АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Россия, 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263. |
|---|---|

Генеральный директор NEOTERICA GmbH
Neoterica GmbH, Германия Grillostrasse 18 45141 Essen, Deutschland
 B.V. Тарабрин

