СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

25.05.2026

ИНСТРУКЦИЯ
по ветеринарному применению лекарственного препарата Стронгомектин®

(Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром», 140070, Московская область, г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-6.26-5486№ПВР-3-6.26/04183

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Стронгомектин®.

Международное непатентованное наименование действующего вещества: селамектин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Стронгомектин® в форме 6% и 12% раствора содержит в 1 мл в качестве действующего вещества соответственно 60 мг и 120 мг селамектина, а в качестве вспомогательных веществ: метиловый эфир дипропиленгликоля, бутилгидрокситолуол, спирт изопропиловый.

3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого цвета до желтого с характерным слабым запахом.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 3 года со дня производства.

Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Стронгомектин® расфасованным в полимерные пипетки в форме 6% раствора по 0,25 мл, 0,75 мл и 1 мл, в форме 12% раствора - по 0,25 мл, 0,5 мл, 1,0 мл, 2,0 мл и 3 мл, упакованные поштучно в блистеры, помещенные в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 2 °С до 30 °С.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Стронгомектин® относится к фармакотерапевтической группе: противопаразитарные лекарственные препараты группы макроциклических лактонов.

10. Селамектин, входящий в состав препарата, обладает широким спектром системного нематодоцидного, инсектицидного и акарицидного действия, активен

43

против нематод, насекомых и саркоптоидных клещей, паразитирующих у собак и кошек. Вещество, обладая ларвицидными и овоцидными свойствами, прерывает цикл развития членистоногих.

Фармакокинетические свойства препарата обеспечивают хорошее всасывание селамектина с места нанесения, длительное поддержание терапевтических концентраций в органах и тканях животного, что обеспечивает уничтожение паразитов и защиту животных от реинвазии в течение месяца. Механизм действия селамектина заключается в его способности связываться с рецепторами клеток (мышечной и нервной ткани) паразитов, повышать проницаемость мембран для ионов хлора, что вызывает блокаду проводимости нервных и мышечных клеток у нематод, насекомых и клещей, вызывая у них паралич и гибель. Учитывая, что у млекопитающих рецепторы, чувствительные к селамектину, локализованы только в центральной нервной системе, а селамектин не проникает через гематоэнцефалический барьер, отравление собак и кошек маловероятно.

Стронгомектин® по степени воздействия на организм относится к «умеренно опасным» веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не обладает местно-раздражающим, резорбтивно-токсическим и сенсибилизирующим действием, хорошо переносится кошками и собаками разных пород, включая колли и родственные породы собак. Препарат токсичен для пчел, а также для рыб и других гидробионтов.

III. Порядок применения

11. Стронгомектин® назначают собакам и кошкам с лечебной и профилактической целью при энтомозах, вызванных блохами, вшами и власоедами, а также при отодектозе, саркоптозе, анкилостомозе, токсокарозе и для профилактики дирофиляриоза.

12. Противопоказанием к применению препарата Стронгомектин® является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе и в анамнезе). Стронгомектин® не следует применять щенкам и котятам моложе 6-недельного возраста, наносить на влажную и/или поврежденную кожу животного.

13. При работе с препаратом Стронгомектин® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

Не следует подпускать животное к маленьким детям, а также гладить место обработки в течение 2 часов после нанесения препарата.

При случайном попадании лекарственного препарата на кожу и слизистые оболочки его следует тотчас удалить тампоном и затем смыть большим количеством проточной воды.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Стронгомектин®. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Беременным и лактирующим самкам при необходимости препарат применяют после консультации с ветеринарным врачом.

49

2

15. Стронгомектин® применяют собакам и кошкам путем однократного нанесения на сухую неповрежденную кожу, используя пипетки различной фасовки. Перед применением препарата пипетку вынимают из блистера и, держа вертикально, отламывают или отрезают ножницами ее кончик, раздвигают у животного шерсть в области спины (между лопатками) и, нажимая на пипетку, наносят препарат на кожу в области холки в одну или несколько точек, согласно таблице:

Вид и масса тела животного, кг	Концентрация раствора, %	Доза (ДВ) селамектина, мг/животное	Номинальный объем используемой пипетки, мл
Кошки			
менее 2,5	6	15	0,25
2,6-7,5	6	45	0,75
7,6-10,0	6	60	1,0
более 10	6	от 75	комбинация пипеток*
Собаки			
менее 2,5	6	15	0,25
2,6-5,0	12	30	0,25
5,1-10,0	12	60	0,5
10,1-20,0	12	120	1,0
20,1-40,0	12	240	2,0
40,1-60,0	12	360	3,0
более 60	12	от 375	комбинация пипеток**

* - например, для кошек массой от 10,1 до 12,5 кг применяют одновременно 2 пипетки с 6% раствором - одну объемом 0,25 мл и одну объемом 1,0 мл.

** - например, для собак массой от 60,1 до 70 кг применяют одновременно 2 пипетки с 12% раствором: одну объемом 0,25 мл и одну объемом 3,0 мл.

Для уничтожения блох (*Ctenocephalides* spp.) Стронгомектин® применяют собакам и кошкам однократно, для предупреждения повторной инвазии - один раз в месяц на протяжении всего сезона наибольшей активности насекомых.

Для профилактики дирофиляриоза в регионах, где регистрируют *Dirofilaria immitis*, Стронгомектин® применяют животным ежемесячно, начиная за месяц до начала лета переносчиков возбудителя - москитов и комаров, и заканчивают не ранее, чем через месяц после завершения их лета.

Препарат не уничтожает половозрелых *D. immitis*, но снижает количество циркулирующих микрофилярий и личинок дирофилярий, и может применяться инвазированным животным.

При замене химиотерапевтических средств в программе профилактики дирофиляриоза, интервал между применением препарата Стронгомектин® и ранее используемым лекарственным средством должен составить не менее одного месяца.

Для лечения собак и кошек при отодектозе (ушной чесотке), вызванном *Otodectes cynotis*, Стронгомектин® применяют однократно. В период лечения рекомендуется проводить очистку слухового прохода от экссудата и струпьев, а в случаях осложнения отодектоза отитом, назначать противомикробные и противовоспалительные средства. При необходимости курс лечения повторяют через один месяц.

45 3

Для лечения собак при саркоптозе, вызванном *Sarcoptes scabiei* var. *canis*, Стронгомектин® применяют двукратно с интервалом один месяц. В целях профилактики возможной инвазии препарат рекомендуется применять один раз месяц.

Для дегельминтизации собак и кошек при токсокарозе, вызванном *Toxocara cati*, *Toxocara canis*, анкилостомозе, вызванном *Ancylostoma* spp., препарат применяют с лечебной целью однократно, с целью профилактики - ежемесячно.

Время, необходимое для полного всасывания препарата Стронгомектин®, составляет около 30 минут. По истечении 2 часов, в случае необходимости, животное можно мыть даже с применением шампуня, эффективность лекарственного препарата при этом не снижается.

16. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явления и осложнений, как правило, не отмечается. В редких случаях у кошек в месте нанесения препарата возможно появление алопеций, которые обычно довольно быстро исчезают без применения лечебных средств.

17. В случае передозировки препарата у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат необходимо смыть водой с моющим средством. Животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

18. Стронгомектин® не следует применять одновременно с другими противопаразитарными препаратами группы макроциклических лактонов, в связи с возможным взаимным усилением их токсичности.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при первом его применении или отмене не выявлено.

20. При обработке животных следует придерживаться рекомендуемых инструкцией интервалов. В случае пропуска очередной обработки, применение лекарственного препарата следует возобновить в той же дозе и по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23.
Наименование и адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя	АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г.о. Люберцы, пгт. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23.

Генеральный директор
АО «НПФ «Экопром» В.В. Тарабрин

46

4